

目的：

醫師懷疑您的子宮輸卵管功能異常、發炎、堵塞或腫瘤時，注入對比劑於子宮輸卵管並行 X 光攝影，可以幫助診斷。

檢查流程/治療步驟：

- 1、仰臥躺在檢查台上，姿勢和婦科門診檢查相同。由醫師以陰道窺管（鴨嘴）張開陰道，以子宮探針測子宮方向、大小，再置入注射軟管後移出陰道窺管，醫師會注射對比劑，再為妳照相（圖一、圖二）。
- 2、檢查過程中，會感覺下腹部悶脹痛，是正常現象，不要驚慌，若有其他不適，請立即告訴醫師。



圖一

圖二

效益：檢查輸卵管是否通暢或檢查子宮腔內是否有病灶。

風險/副作用/合併症/併發症：

- 1、常見併發症為下腹部疼痛、輕微陰道出血。
- 2、少數併發症為過敏反應、血管或淋巴管內注入對比劑、骨盆腔感染、子宮或輸卵管破裂、骨盆腔沾黏、子宮內膜異位等。
- 3、患有心臟病嚴重者，可能在檢查中再次發生心肌梗塞，請務必告訴醫生。

注意事項：

※ 門診病人請持此說明書至影像醫學科櫃台，先確立排檢日期及時間。請您依報到時間攜帶健保 IC 卡至南棟 2F 影像醫學科櫃台報到登記。若檢查當日不克前來，請以電話聯絡改期。

電話：02-89667000，分機 2218 或 1109。

- 1、檢查的禁忌：懷孕、子宮外孕、骨盆腔發炎、月經剛結束或快來時及對含碘對比劑過敏者。
曾
注射對比劑而引起不良反應，應告知醫護人員。
- 2、檢查時機：月經完全乾淨過後 7 天內，在排卵之前最適宜。
- 3、進食、藥物：
(1)檢查當日早上 5:00 後禁食，但水可少量喝。
(2)本正在服用的藥物請繼續使用，例如：降血壓藥、心臟病藥…等，但糖尿病藥請暫停服用一次(因沒有進食)。
- 4、請一位家屬陪同前來。
- 5、請帶 1~2 片衛生棉或護墊備用。

6、檢查結束：

- (1) 可進食，請多喝水，以利對比劑排出。
- (2) 若婦科門診有開消炎藥（抗生素）給妳，做完檢查仍請繼續服用。
- (3) 檢查後二到三天會有輕微的出血是正常的，若有大量出血請立即就診求治（婦產科門診或急診）。

其他替代方案：

超音波、磁振造影、腹腔鏡或子宮鏡…等，如有疑問，請向您的婦產科醫師諮詢。

後續治療計畫與預期結果：

檢查結果，請向您的婦產科醫師諮詢。