


目的：

定位術大多用於臨床上無法由觸診發現，且超音波檢查無法定位，而乳房 X 光攝影可清楚發現乳房病灶或可疑的鈣化。藉由乳房 X 光攝影的輔助，將定位針由體表穿刺置入乳房內病灶的位置，幫助外科醫師做病灶的切除。

檢查流程/治療步驟：

- 1、更換檢查服，請移除頸部以下大腿以上的金屬物品，勿穿著有金屬拉鍊、鈕扣的衣褲。
- 2、採取坐姿姿勢，將乳房均勻壓平。
- 3、檢查部位皮膚會消毒，經由皮下注射局部麻醉針。
- 4、在乳房 X 光攝影的導引下，將定位針穿刺進入乳房病灶內，並留置定位線於位置(圖一)。
- 5、結束時以紗布及膠帶固定定位線。



圖一

效益：

當乳房內發現鈣化(或疑似腫塊)的病灶，欲以外科手術取出，需要定位病灶確切位置，以協助醫師施行精確的病灶切除。

風險/副作用/合併症/併發症：

極少發生不適的併發症，但極少數病人可能會發生下列的情形：

- (1)暈針：約有 7%的病人出現短暫的頭暈、冒冷汗、血壓下降，甚至昏倒的情形，多見於年輕

女性。

- (2)出血：約有 1%的病人，有乳房局部的短暫少量出血，如有服用抗凝血或抗血小板藥物，如 Aspirin(阿斯匹林)...等，要告知醫護人員。
- (3)疼痛：大部分病人都可忍受，僅約 1%的病人會感覺較痛，但多數會在短暫時間後消失。
- (4)感染：此種情形極為罕見。

注意事項：

1、門診受檢者：

- (1)請持此說明書至影像醫學科櫃台，先確立排檢日期及時間。
 - (2)請依報到時間攜帶健保 IC 卡至北棟 B1F 高階影像中心櫃台報到登記。
 - (3)如有其他疑問或檢查當日不克前來，請來電洽詢 (02)8966-7000 分機 1394 或 4640。
- 服務時間：上班日，星期一~星期五 8:00 至 17:00。

2、禁食：配合檢查當天手術所需的禁食。禁食期間降血糖藥物請暫停服用（因沒有進食），原本正在服用的藥物請繼續使用，如降血壓藥、心臟病藥等，以適量開水送服。

3、請至少一位家屬陪同，前來報到至檢查完畢。

4、暈針：少數病人因過度緊張及定位針穿刺的過程中發生暈針的症狀，平躺休息且雙腳抬高，靜脈點滴並保暖。

5、出血：可局部外壓數分鐘後即可止血。

6、疼痛：若有疼痛無法忍受，需告知醫護人員。

7、門診病人，隨後至開刀房由外科醫師做可疑病灶的切除；住院病人先回病房休息，等候開刀房通知。

其他替代方案：

若病人的乳房病灶亦可由超音波檢查清楚呈現，可由超音波導引的方式來做定位，但若只有乳房 X 光攝影才能發現病灶，本院目前仍以此方式導引為最佳定位的選擇。

後續治療計畫與預期結果：

檢查後續的治療計畫請您與您的診治醫師做進一步的討論。