


目的：


- 1、懷疑有大腸病灶，經臨床醫師評估需接受此檢查。
- 2、評估癌症的侵犯程度和遠端轉移。

檢查流程/治療步驟：

- 1、受檢者平躺在電腦斷層檢查台上，請放輕鬆由醫護人員為您置入肛管(圖二)。
- 2、由肛管慢慢灌入適量的空氣到大腸中，會覺得腹脹感請配合深呼吸放輕鬆，勿將空氣解出，過程中有任何不適請立即告知醫護人員(圖二)。
- 3、檢查時會請配合平躺或俯臥。
- 4、注射對比劑，如全身感覺熱是正常的，勿驚慌。



圖一、肛管灌空氣示意圖



圖二、檢查台示意圖

效益：

評估大腸病灶，並提供臨床資訊以利後續治療。

風險/副作用/合併症/併發症：

檢查可能發生的併發症：腸管破裂及空氣滲漏至腹膜腔內，發生率約 0.05%，需緊急處理及治療。

注意事項：

- 1、禁忌症：
 - (1)懷孕
 - (2)檢查前七天內曾採檢病理組織
 - (3)大腸完全阻塞

(4)毒性巨結腸症

2、門診病人請持此說明書至影像醫學科櫃台，先確立排檢日期及時間。請您依報到時間攜帶健保IC卡至南棟 2F 影像醫學科櫃台報到登記。若檢查當日不克前來，請以電話聯絡改期。

電話:02-89667000，分機 2218 或 1109。

*檢查前 1 週內曾做大腸鏡檢查並切片者，需調整檢查時段。

3、請至少一位家屬陪同前來報到至檢查完畢。

4、檢查前準備：

*上午檢查：

(1)檢查前二天：三餐請吃低渣食物如麵條、稀飯、白土司、白饅頭、少吃肉類、青菜，並在睡前服用二顆瀉藥。

(2)檢查前一天：

a. 三餐，請吃無渣全流質食物如茶水、米湯、無渣果汁、運動飲料；禁吃高纖食物（如 蔬菜、水果）及魚肉、牛奶等，以免形成糞便或腸氣。

b. 下午 13：00~21：00 每小時喝 250 cc開水，糖尿病者視情況喝糖水，以免血糖過低。

c. 晚上九時再服用二顆瀉藥，午夜 12 點後開始禁食。

(3)檢查當天：

a. 起床後請先以甘油球灌腸，忍住數分鐘後再解便。

b. 禁吃任何食物及飲料，口乾者只能漱口，水不可吞下。

c. **禁食期間降血糖藥物請暫停服用（因沒有進食），原本正在服用的藥物請繼續使用，如降血壓藥、心臟病藥等，以適量開水送服。**

*下午檢查：

(1)檢查前二天：三餐請吃低渣食物如麵條、稀飯、白土司、白饅頭，少吃肉類、青菜，並在睡前服用二顆瀉藥。

(2)檢查前一天：

a. 三餐，請吃無渣全流質食物如茶水、米湯、無渣果汁、運動飲料；禁吃高纖食物（如蔬菜、水果）及魚肉、牛奶等，以免形成糞便或腸氣。

b. 下午 13：00~21：00 每小時喝 250 cc開水，糖尿病者視情況喝糖水，以免血糖過低。

(3)檢查當天：

a. 早上 6：00 前吃早餐，請吃無渣全流質食物如茶水、米湯、無渣果汁、運動飲料；禁吃高纖食物(如蔬菜、水果)及魚肉、牛奶等，以免形成糞便或脹氣。

b. 早上 6：00 再服用二顆瀉藥，並開始禁食(包括水)，口乾者只能漱口，水不可吞下。

c. 中午 12：00 請以甘油球灌腸，忍住數分鐘後再解便。

d. **禁食期間降血糖藥物請暫停服用(因沒有進食)，原本正在服用的藥物請繼續使用，如降血壓藥、心臟病藥等，以適量開水送服。**

5、檢查後：

(1)請先喝水，如果沒有不舒服再進食。

(2)檢查後排氣比較頻繁，屬正常現象。

其他替代方案：

- 1、 大腸鏡檢查。
- 2、 成人下消化道攝影檢查。
- 3、 不實施醫療處置可能的後果：可能延誤您的病情診斷，錯失治療時機。

後續治療計畫與預期結果：

檢查後續的治療計畫請您與您的診治醫師做進一步的討論。