


**目的：**

身體器官遭受感染，導致局部膿液堆積在體內組織或體腔中。膿瘍引流術可將引流管放置在膿瘍處，使膿液流出，達到治療的效果。

**檢查流程/治療步驟：**

1. 依膿瘍部位之不同而需要採取不同姿勢，當時間較久可能會造成您的不適，但仍需要您的配合維持固定姿勢，避免併發症發生。
2. 皮膚會消毒然後覆蓋消毒的布巾，經由皮下注射局部麻醉劑或經由肌肉或靜脈給予止痛劑(圖一)。
3. 接著會在X光透、超音波或電腦斷層引導下以穿刺針穿刺至膿瘍處(圖二)。
4. 確定位置後將引流管置入，最後將引流管固定在皮膚表面並接上引流袋，完成整個處置。
5. 檢查過程需 40-60 分鐘，但困難的情況可能花費兩個小時以上，術中如有任何問題請告知醫師。

**效益：**

- 1、降低肝臟膿瘍相關之死亡率及併發症如膿瘍裂。
- 2、可使症狀減輕，縮短療程。
- 3、化驗導致膿瘍的致病菌及其對藥物(抗生素)的敏感性，有助於後續治療。

**風險/副作用/合併症/併發症：**

- 1、麻醉劑引起的不良反應。
- 2、菌血症。
- 3、出血。
- 4、消化道穿孔。
- 5、肋膜膿瘍。
- 6、膽汁性腹膜炎。

7、肝臟內血腫塊或破裂。

8、瘻管。

9、嚴重時可能休克。

\* 這些併發症發生的機率均小於 10%，而死亡率則小於 1%。

### 注意事項：

1、禁忌症：

(1)受檢者意識不清、無法配合。

(2)病人凝血功能異常或服用抗凝血劑導致凝血時間延長。

(3)報到時請攜帶健保 IC 卡。

(4)請一位家屬陪同前來報到至檢查完畢。

(5)檢查結束，建議臥床平躺休息 4-6 小時，且需留在醫院內觀察、處置，若有任何不適，應立即告知醫護人員。

### 其他替代方案：

1、抗生素保守治療。

2、手術引流。

### 後續治療計畫與預期結果：

檢查後續的治療計畫請您與您的診治醫師做進一步的討論。